

ALDONAL nM®



DIÉTÁS TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ HASMENÉS VESZÉLYE ESETÉN

- a víz és az elektrolit egyensúlyának stabilizálása érdekében.
- optimális koncentrációban tartalmaz lúgosító összetevőket és bél nyálkahártya védelmező anyagokat.

Összetétel: Laktóz, nátrium-hidrogén-karbonát, nátrium-klorid, kálium-klorid, magnézium-karbonát, élesztő és élesztő alkotóelemei, csillagánizs.

Kiszerezés: 1 Doboz 12 tasak, 100 g

Adagolás: Borjú és csikó: oldja fel a tasak tartalmát (100 g) 1,5 liter langyos vízben és keverje össze.
Malac, gida és bárány: oldjunk fel 20 g-ot 30 cl langyos vízben és keverjük össze.
Adjuk be az elkészített oldatot legalább naponta kétszer, 1-7 napon át

LACTIGEST



FOLYÉKONY TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ, NAGY EMÉSZTHETŐSÉGGEL BORJAK ÉS MALACOK RÉSZÉRE

- Támogatja a bélrendszert, puffadás esetén alkalmazandó.
- A LACTIGEST-et a tejjel való etetés után kell alkalmazni.
- könnyen emészthető
- A LACTIGEST-t „tisztá” formában, közvetlenül a szájba kell beadni, közvetlenül a táplálás után

Összetétel: szorbitol - pektin - zselatin vitamin.

Kiszerezés: flakon 250 ml és 1L

Adagolás: Borjak: 60 ml (3-4 evőkanál) naponta kétszer
Malacok: 5 ml (1 kávéskanál) naponta kétszer-háromszor vízben vagy tejben)



EQUANOL M



DIÉTÁS TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ BORJAK SZÁMÁRA. HASMENÉS VESZÉLYE ESETÉN

- a víz- és elektrolit-egyensúly stabilizálása érdekében.
- serkenti az emésztést a tejsavas erjesztéssel és támogatja többek között a nátrium szállítását glükózon keresztül.
- szájon át adható rehidrációs oldat (ORS), amely alapvető elektrolitokban gazdag és kompatibilis a tejjel táplálással.

Összetétel: Dextróz, kukoricakeményítő, nátrium-klorid, nátrium-karbonát, kálium-klorid, magnézium-karbonát, csillagánizs.

Kiszerezés: 1 Doboz 12 tasak, 42 g
borjak: oldja fel a tasak tartalmát (42 g) 1 l langyos vízben és keverje össze.

Adagolás: Adjuk be a feloldott ORS-t, naponta egyszer-kétszer, 1-7 napon át.



FERMENT 2.0



DIÉTÁS TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ BORJAK SZÁMÁRA. HASMENÉS VESZÉLYE ESETÉN

- Pro- és prebiotikumok a borjú emésztőrendszerének pH-jához igazítva.
- Emésztési zavarok veszélye esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor.

Összetétel: Dextróz, frukto-oligoszacharidok, élesztő, élesztőtermékek és kukoricakeményítő. Bélflóra-stabilizátorok: Enterococcus faecium + Lactobacillus rhamnosus

Kiszerezés: 250 g flakon és 1400 g vödör

Adagolás: Borjú: 15 g (2 kanál) por reggel és este, 4 héten át.
A por keverhető vízbe, takarmányba, a kolosztrumba vagy tejbe is.