

APLAZYL®

FEED
ADDITIVES



HU APLAZYL® Kiegészítő takarmány kutyáknak és macskáknak.

Tulajdonságok

Az APLAZYL® rendkívül intenzív izületvédő hatáshoz, támogatja és erősíti a porckat, és elősegíti azok regenerálódását, növeli a kötőszövet erejét és rugalmasságát, kielégíti a mozgásszervi megnövekedett táplálkozási igényeit a növekedés és az intenzív erőfeszítések ideje alatt, és fenntartja az ízületek rugalmasságát.

Használat

Az APLAZYL® idős kutyáknál, táplálékkiegészítésként kótyókkutyáknál, életük első évében, mozgásszervi betegségek, műtétek utáni lábadozási időszakban, orvosi, gyógyszeres kezelések mellett, intenzív terhelés előtt, közben és utána, versenyre való felkészítés folyamán, táplálékkiegészítésként a vemhesség és szoptatás ideje alatt.

Használati útmutató

Szájon át történő alkalmazás, eleségre keverve, vagy közvetlenül a szájba.

- Kutya: 1 tableta 10 kg testsúlyra, naponta egyszer.
- Macska: ½ tableta, naponta egyszer.

Szedése kúraszerűen legalább 1 hónapig ajánlott, szükség esetén meghosszabbítható.

Összetétel:

Új-zélandi zöldkagyló (*Perna canaliculus*), 2KCl glükózamin-szulfát, chondroitin-szulfát (csirke), Zöld alga por (*Chlorella pyrenoidosa*), halolaj, magnézium-sztearát és a gyógynövények feldolgozásából származó termékek: csalán (*Urtica dioica*). Analitikai alkotóelemek: nyersfehérje 26%, nyers hamu 9,6%, nyersolaj és zsír 7%, nyersrost 23,1%. Adalékanyagok: Nyomelemek: aminosavak mangán kelátja, hidrát (3b504) mangán = 2 000 mg / kg. 2b. Ízesítés (növényi kivonatok): tömjénfa (*Boswellia serrata*) 44.000 mg / kg és ördögkarom (*Harpagophytum procumbens*) 12.000 mg / kg.

Tárolás

Száraz helyen, szobahőmérsékleten, az eredeti csomagolásban tárolandó. Gyártási szám, lejárati idő: lásd a csomagoláson

Övintézkedések

Használat előtt kérjen tanácsot állatorvosától. Gyermekek elől elzárva kell tartani!

Csomagolás

A doboz 60, 120, 300 vagy 600 osztható tablettát tartalmaz, buborékcsoomagolásban, 1.700 mg

Energia: 27,2 kJ / tableta.

EN APLAZYL® Complementary feed for dogs and cats

Properties

APLAZYL® supports the locomotor functions, maintains the flexibility of the joints and lubricates the cartilage. APLAZYL® meets also the increased nutritional needs of the musculoskeletal system during the growth and the periods of intense efforts.

Use

APLAZYL® is advised: in aged animals, in puppies in growth phase, in animals in the period of reevaluation and in sporting dogs. APLAZYL® can also be used in gestating or lactating bitches.

Instructions for use

Offer directly the tablet or mix it in the feed.

- Dog: 1 tablet per 10 kg bodyweight, once a day.
- Cat: ½ tablet, once a day.

During at least 1 month. The cure can be extended if necessary.

Composition

Aquatic invertebrates (*Perna canaliculus*), glucosamine sulphate 2KCl, chondroitin sulphate (chicken), algae (*Chlorella pyrenoidosa*), fish oil, magnesium stearate and products from the processing of herbs: stinging nettle (*Urtica dioica*). Analytical constituents: crude protein 26 %, crude ash 9,6 %, crude oils and fats 7 %, crude fibre 23,1 %. Additives: *Trace elements*: manganese chelate of amino acids, hydrate (3b504) manganese = 2.000 mg/kg. *Flavouring 2b (plant extracts)*: incense tree (*Boswellia serrata*) 44.000 mg/kg and devil's claw (*Harpagophytum procumbens*) 12.000 mg/kg.

Storage

Store in a dry place, at ambient temperature, in the original packaging. Best before: see box.

Precautions

Seek advice from your vet, before use. Keep out of reach of children.

Packaging

boxes of 60, 120, 300 or 600 blister-packaged divisible tablets of 1.700 mg.

Energy : 27,2 kJ / tablet.

